

Écho Graphies

**nouvelles médicales,
par Emmanuèle Garnier**

Syndrome coronarien aigu

**ne plus attendre
avant de pratiquer un cathétérisme**



Le Dr Richard Gallo.

L'American College of Cardiology et l'American Heart Association devraient bientôt changer leurs lignes directrices concernant le traitement des patients souffrant d'un syndrome coronarien aigu. Les résultats de l'étude TACTICS-TIMI 18 présentés au congrès de l'American Heart Association ont révélé qu'une intervention effractive précoce permet de réduire les problèmes cardiaques graves chez les malades traités au préalable avec le

Suite page 107 >>>

Échographies, ce mois-ci

Syndrome coronarien aigu ne plus attendre avant de pratiquer un cathétérisme	89
Polyarthrite rhumatoïde un nouveau traitement biologique	113
Rectificatif	113
2001, le début d'une vie sans tabac?	116
MTS et sida protéger les jeunes hommes	116

Poste à pourvoir

Adjoint au directeur de la Formation professionnelle pour la FMOQ

Sous l'autorité immédiate du directeur de la Formation professionnelle, l'adjoint au directeur aura la responsabilité de :

- planifier et coordonner des stages cliniques organisés par et pour des médecins omnipraticiens ;
- réaliser à l'échelle provinciale des programmes éducatifs ;
- valider les demandes de ressourcement et recommander au MSSS leur acceptation ou leur refus ;
- valider la pertinence des programmes de formation soumis à un examen préalable ;
- maintenir des communications avec les responsables de la formation médicale continue et les soutenir dans leurs tâches ;
- participer à l'édition de la revue *Le Médecin du Québec*.

Une description plus détaillée des tâches sera envoyée au candidat intéressé.

Exigences

Le candidat doit :

- être médecin omnipraticien ;
- avoir une bonne connaissance de la formation continue ;
- avoir une expérience variée des différents aspects de la médecine générale ;
- pouvoir concevoir et rédiger des documents et communiquer avec les médecins ;
- avoir un intérêt pour l'édition d'une revue médicale ;
- avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit ;
- avoir une connaissance valable de l'anglais.

Conditions de travail

- Poste à plein temps avec exclusivité d'emploi à compter du 1^{er} juillet 2001
- Contrat de cinq ans, renouvelable
- Programme d'avantages sociaux
- Rémunération à négocier

Toutes les candidatures seront traitées de façon strictement confidentielle.

Les médecins intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 février à :

**D^{re} Raymonde Vaillancourt
présidente, comité de sélection**

**Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec) H3G 1R8**

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

chez des femmes adultes qui ont reçu un traitement séquentiel (i.v. – oral) par **ZITHROMAX** au cours d'essais cliniques sur les **infections génitales hautes**, les effets indésirables les plus fréquents (> 1 %) ont été de nature digestive. La diarrhée (8,5 %) et les nausées (6,6 %) ont été les plus fréquentes, suivies de la vaginite (2,8 %), des douleurs abdominales (1,9 %), de l'anorexie (1,9 %), des éruptions cutanées du prurit (1,9 %). Au cours des mêmes essais, quand l'azithromycine a été administrée en concomitance avec du métronidazole, une proportion plus élevée de femmes ont subi les effets indésirables suivants : nausées (10,3 %), douleurs abdominales (3,7 %), vomissements (2,8 %) et enfin, réaction au point d'injection, stomatite, étourdissements ou dyspnée (1,9 % chacun).

Effets indésirables suivants sont apparus à une fréquence de 1 % ou moins :

Appareil digestif : dyspepsie, flatulence, mucosité, muguet et gastrite

Système nerveux : céphalée et somnolence

Allergies : bronchospasmes

Organes sensoriels : dysgueusie

OMALIES DES RÉSULTATS D'ANALYSE

Itémement par la voie orale

chez l'adulte

Cours des essais cliniques, on a rapporté les anomalies notables suivantes (liées ou non au traitement) :

Augmentation de 1 à 2 % : hausse du taux sérique de créatine phosphokinase, de la kaliémie, des taux sériques d'ALAT (SGPT), de γ -GT et d'ASAT (SGOT).

Augmentation inférieure à 1 % : leucopénie, neutropénie, diminution du nombre de plaquettes, hausse du taux sérique de phosphatase alcaline, de la bilirubinémie, du taux d'azote uréique sanguin, de la créatinémie, de la glycémie, du taux sérique de LDH et de la phosphatémie.

Le suivi des patients a révélé que les anomalies mises en évidence par les épreuves de laboratoire étaient réversibles.

Cours d'essais cliniques où on a administré des doses multiples à plus de 3000 sujets, trois d'entre eux ont abandonné le traitement en raison d'anomalies des enzymes hépatiques reliées au traitement et quatrième, à cause d'une anomalie de la fonction rénale.

PHARMACOLOGIE ET ADMINISTRATION

TRAITEMENT

chez l'adulte

CONTRAINDICATIONS : Les comprimés **ZITHROMAX** peuvent être administrés avec ou sans nourriture.

Sur les infections de la peau et de ses annexes ainsi que les infections des voies respiratoires supérieures et inférieures : La posologie recommandée de **ZITHROMAX** pour le traitement des adultes âgés de 16 ans ou plus est de 500 mg en une seule prise le 1^{er} jour, suivie de 250 mg, une fois par jour, du 2^e au 5^e jour, soit une dose totale de 1,5 gramme.

Il n'a été décelé aucune variation importante de la pharmacocinétique de l'azithromycine dans le sang, chez les patients atteints d'une dysfonction hépatique légère ou modérée, comparativement à ceux chez lesquels la fonction hépatique était normale. Par ailleurs, l'élimination de l'azithromycine par la voie urinaire semble augmenter chez ces patients. Il n'est donc pas nécessaire de régler la posologie chez les patients souffrant d'une dysfonction hépatique légère ou modérée. Néanmoins, le foie étant la principale voie d'élimination de l'azithromycine, la prudence s'impose lorsqu'il s'agit de prescrire **ZITHROMAX** à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse

chez l'adulte

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.

Utilisation intraveineuse : **ZITHROMAX** est administré par perfusion intraveineuse à des malades souffrant d'une hépatopathie grave.



Sophie Tremblay,
PI. Fin.



Jean-Pierre Tremblay, vice-président exécutif de la Société est heureux d'annoncer la nomination de Madame Sophie Tremblay au poste de conseiller financier.

Les Fonds d'investissement FMOQ inc. est une filiale créée par la **Fédération des médecins omnipraticiens du Québec**, pour prendre en charge le service à la clientèle, la promotion et le développement des Fonds FMOQ. Ces Fonds ont été mis en place à l'intention des membres de la Fédération et de leurs proches en 1979 et totalisent maintenant 500 millions \$ d'actifs.

Mme Tremblay est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires – option finances et d'un diplôme de l'Institut québécois de planification financière. Elle possède également de nombreuses années d'expérience au niveau des services financiers aux particuliers.

1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1012, Montréal (Québec) H3G 1R8

Téléphone : (514) 868-2081 • Sans frais : 1 888 542-8597

et

2960, boul. Laurier, bureau 040, Ste-Foy (Québec) G1V 4S1

Téléphone : (418) 657-5777 • Sans frais : 1 877 323-5777

107



©2000

Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec)
H9J 2M5

no.1.LRTI.10/99
*M.C. de Pfizer Products Inc.
Pfizer Canada Inc., licencié

tirofiban (Aggrastat®), un inhibiteur des récepteurs plaquettaires GP IIb/IIIa.

« C'est la première grande étude qui montre que l'approche effractive est plus efficace chez ces patients. Ces résultats vont avoir des répercussions sur notre pratique », souligne le Dr **Richard Gallo**, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.

L'étude TACTICS-TIMI 18, réalisée par le Dr **Christopher Cannon** et son équipe, comptait 2220 patients souffrant d'angine instable ou d'un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST. Les sujets avaient soit des changements électrocardiographiques, soit un taux élevé de marqueurs cardiaques, soit des antécédents de maladie coronarienne. Les participants étaient immédiatement traités avec de l'aspirine, de l'héparine et du tirofiban. Un groupe a reçu un traitement effractif précoce, comprenant un cathétérisme dans les 4 à 48 heures et, éventuellement, une revascularisation. L'autre groupe a été traité de manière classique : ses membres n'ont eu un cathétérisme que s'ils montraient des signes d'ischémie spontanément ou au cours des examens. Ainsi, 97 % des participants du groupe traité de manière effractive et

COMPOSITION

Chaque comprimé VIOXX® (rofécoxib) renferme 12,5 mg ou 25 mg de rofécoxib et les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose, lactose, oxyde ferrique jaune et stéarate de magnésium.

Chaque 5 mL de la suspension orale VIOXX® renferme 12,5 mg de rofécoxib et les ingrédients non médicinaux suivants : acide citrique (monohydraté), citrate de sodium (dihydraté), eau purifiée, gomme xanthane, solution de sorbitol et arôme de fraise, ainsi que du méthylparabén sodique à 0,13 % et du propylparabén sodique à 0,02 % comme agents de conservation.

STABILITÉ ET ENTREPOSAGE

Comprimés VIOXX®

Conserver à 25 °C; des écarts sont permis entre 15 °C et 30 °C (température ambiante).

Suspension orale VIOXX®

Conserver à 25 °C; des écarts sont permis entre 15 °C et 30 °C (température ambiante). Craint le gel. Bien agiter avant l'emploi.

PRÉSENTATION

Le comprimé VIOXX® à 12,5 mg est crème ou blanc cassé, rond et porte le code MRK 74 d'un côté de la cupule et VIOXX de l'autre. Flacons de 30 et de 100.

Le comprimé VIOXX® à 25 mg est jaune, rond et porte le code MRK 110 d'un côté et VIOXX de l'autre. Flacons de 30 et de 100.

La suspension orale VIOXX® à 12,5 mg/5 mL est opaque, blanche ou jaune pâle, à saveur de fraise. La suspension est obtenue facilement en agitant. Flacon de 150 mL (12,5 mg/5 mL).

MONOGRAPHIE FOURNIE SUR DEMANDE

(661-a,8,00)

5525b, 5526b, 5966b, 5967b, 5968b

Membre



MERCK FROSST

Découvrir toujours plus.
Vivre toujours mieux.

MERCK FROSST CANADA & CIE

C.P. 1005, POINTE-CLAIRE
DORVAL (QUÉBEC) H9R 4P8

échographies

51 % de ceux qui ont été soignés de manière traditionnelle ont eu droit à un cathétérisme.

Le principal critère d'évaluation utilisé dans cette étude était le décès, un infarctus du myocarde ou une réhospitalisation pour un syndrome coronarien aigu dans les six premiers mois. Ces problèmes ont frappé 15,9 % du groupe traité précocement et 19,4 % de celui soigné de manière classique. « Ces résultats sont surtout dus à une diminution marquée du nombre d'infarctus. Leur taux était de 4,8 % dans le groupe traité de façon effractive et de 6,9 % dans l'autre », précise le Dr Gallo. Le taux de mortalité, par contre, était similaire dans les deux groupes de cette étude, par ailleurs subventionnée par Merck et Co., fabricant du tirofiban.

Deux hypothèses pourraient expliquer les résultats de TACTICS-TIMI 18, selon le Dr Cannon et ses collègues. Il serait possible que l'intervention effractive prévienne plus efficacement l'apparition d'autres problèmes cardiovasculaires que la méthode classique. Mais le recours à l'inhibiteur de la GP IIb/IIIa utilisé à également pu améliorer l'effet du traitement précoce. « Le tirofiban a eu un effet protecteur pendant la dilatation », pense de son côté le Dr Gallo.

D'utiles marqueurs

L'étude TACTICS-TIMI 18 confirme également les troponines T dans leur rôle de marqueurs. Leur dosage permettrait de choisir la meilleure stratégie. Les sujets dont la concentration de troponines était élevée au moment de l'admission à l'hôpital risquaient davantage de mourir, d'avoir un infarctus du myocarde ou d'être à nouveau

hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu plus élevé. Toutefois, ceux qui bénéficiaient du traitement effractif précoce risquaient moins d'être victimes de ces problèmes cardiaques : 14,3 % l'ont été dans ce groupe expérimental, et 24,2 % dans le groupe traité de manière traditionnelle. Cependant, lorsque la concentration de troponines T était normale, aucune différence significative n'apparaissait entre les deux groupes.

Une autre catégorie de patients bénéficiaient également du traitement effractif précoce : ceux dont l'électrocardiogramme présentait un sous-décalage du segment ST. Dans le groupe soigné selon la méthode classique, 26,3 % ont eu un grave problème cardiaque ultérieur, tandis que seulement 16,4 % des sujets ayant subi une intervention précoce en ont été victimes.

L'étude TACTICS-TIMI 18 vient ainsi mettre un terme à l'hésitation des spécialistes au sujet du traitement des patients souffrant d'un syndrome coronarien aigu. « Dans les années 80, deux études, TIMI IIIB et VANQWISH, ont montré la supériorité d'une approche prudente. Donc, les patients recevaient un traitement médical, puis les médecins observaient et investigaient au besoin. Si le malade présentait une ischémie, il subissait un cathétérisme ou une intervention comme une angioplastie ou un pontage. Mais ces études-là ont été menées avant le raffinement de l'angioplastie, l'utilisation des tuteurs coronariens et le recours aux inhibiteurs de la GP IIb/IIIa. Il y a deux ans, cependant, l'étude scandinave FRISC II a

montré qu'une stratégie plus effractive donnait de meilleurs résultats cliniques », explique le D^r Gallo.

Quelles seront les répercussions des conclusions de TACTICS-TIMI 18 au Québec ? « Cela signifie que les patients dont le dosage de troponines est positif ou dont l'électrocardiogramme présente des changements devraient subir un cathétérisme dans les 24 à 48 heures. Les centres qui ont un service d'hémodynamie recevront ainsi plus de malades. Cela deviendra une question d'utilisation des ressources. »

Polyarthrite rhumatoïde un nouveau traitement biologique

Santé Canada vient d'approuver le premier agent biologique contre la polyarthrite rhumatoïde : l'éтанercept (Enbrel®). Il inhibe une cytokine qui joue un rôle clé dans le processus inflammatoire de la maladie, le facteur de nécrose des tumeurs.

Le médicament, qui sera commercialisé au début de mars, est indiqué pour réduire les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde chez les adultes qui n'ont pas répondu adéquatement à un antirhumatismal modificateur de la maladie. L'éтанercept peut également être associé au méthotrexate lorsque ce dernier n'est pas efficace seul.

Une action rapide

L'éтанercept, qui doit être injecté bihebdomadairement, peut améliorer l'état du patient dès la première semaine. Il atteint habituellement sa pleine efficacité après trois mois.

Comment se situe l'agent biologique par rapport au méthotrexate ? Il agirait plus rapidement, selon une étude publiée récemment dans le *New England Journal of Medicine* et soutenue financièrement par Immunex, le fabricant de l'éтанercept¹.

1. Bathon J, Martin RW, Fleishman RM, et al. A comparison of etanercept and methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. *N Engl J Med* 2000 ; 343 : 1586-93.

Pendant 12 mois, le D^r Joan Bathon et ses collègues ont suivi 632 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde depuis moins de trois ans. Les sujets prenaient soit une dose de 10 mg d'éтанercept deux fois par semaine, soit une dose bihebdomadaire de 25 mg, soit quelque 19 mg de méthotrexate par voie orale par semaine.

Dès la première évaluation, à la deuxième semaine, une différence a commencé à se manifester entre l'effet des deux médicaments. Au bout de six mois, les patients traités avec la plus forte dose d'éтанercept étaient proportionnellement plus nombreux à connaître une amélioration de 20 %, de 50 % ou de 70 % de leurs symptômes. Mais par la suite, le pourcentage des sujets qui bénéficiaient de ces progrès a été le même dans les deux groupes. Cependant, chez 72 % des sujets prenant 25 mg d'éтанercept, le degré d'érosion n'a pas augmenté, ce qui n'a été le cas que de 60 % des patients qui ont reçu le méthotrexate. Le traitement biologique a également entraîné moins d'effets secondaires.

Immunex devrait bientôt déposer une demande d'autorisation additionnelle auprès de Santé Canada pour que l'éтанercept puisse être prescrit en première intention chez les adultes.

Des contre-indications au médicament biologique ? Il ne doit pas être prescrit aux patients qui souffrent d'une septicémie ou qui seraient susceptibles d'en avoir. Dans les rapports de pharmacovigilance, des infections graves ont été signalées dans moins d'un cas sur 100, et des septicémies dans moins d'un cas sur 1000. Mais bien des patients touchés étaient plus vulnérables aux infections à cause de maladies concomitantes.

Rectificatif

Dans l'article intitulé *Du nouveau dans le monde des antibiotiques* paru dans le numéro d'octobre 2000, on aurait dû lire dans le troisième paragraphe : « Les données de pharmacovigilance [pour la moxifloxacine] révèlent que chez les 1,2 million de patients et plus à qui l'antibiotique a été prescrit, 379 réactions indésirables (et non graves) ont été signalées. Vingt-deux étaient liées à des

On ne sait pas si la simvastatine et ses métabolites peuvent être éliminés par hémodialyse.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Avant de recevoir ZOCOR® (simvastatine), le patient devrait être soumis à un régime alimentaire équivalant au moins à la phase 1 du régime de l'American Heart Association (AHA) qu'il devra poursuivre pendant le traitement médicamenteux. Un régime hypocalorique et un programme d'exercices peuvent également être instaurés si l'on juge ces mesures nécessaires.

Chez la plupart des patients, la posologie recommandée est de 10 à 40 mg par jour. La posologie maximale est de 80 mg par jour, dose qui peut être requise pour une minorité de patients chez qui les doses plus faibles ne permettent pas d'atteindre les valeurs cibles recommandées dans les lignes de conduite canadiennes sur le cholestérol et les lignes directrices du NCEP.

Maladie coronarienne

Les patients atteints de maladie coronarienne et d'hypercholestérolémie primitive peuvent recevoir une dose initiale de 20 mg par jour, prise en une seule fois, dans la soirée. Le réglage de la posologie, s'il est nécessaire, devrait être réalisé à intervalles d'au moins 4 semaines; la posologie ne doit pas excéder 80 mg par jour, administrés en une seule fois, dans la soirée.

Hyperlipidémie

La dose initiale habituelle est de 10 mg par jour, prise en une seule fois, dans la soirée. Les patients atteints d'hypercholestérolémie légère ou modérée peuvent recevoir une dose initiale de 5 mg de ZOCOR®. Le réglage de la posologie, s'il est nécessaire, devrait être réalisé conformément aux directives ci-dessus (voir Maladie coronarienne sous POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

On doit procéder périodiquement à une évaluation du taux de cholestérol et envisager la possibilité de réduire la posologie de ZOCOR® si les concentrations de cholestérol atteignent des valeurs inférieures aux valeurs cibles recommandées dans le deuxième rapport du NCEP (U.S. National Cholesterol Education Program) (voir BIBLIOGRAPHIE).

Traitement concomitant

Voir Association avec d'autres régulateurs du métabolisme lipidique à la rubrique Interactions médicamenteuses.

Lorsque les patients prennent de la cyclosporine, des fibrates ou de la niacine en association avec ZOCOR®, la posologie maximale recommandée de ZOCOR® est de 10 mg par jour (voir Myopathie causée par une interaction médicamenteuse sous MISE EN GARDE).

COMPOSITION

ZOCOR® (comprimés de simvastatine, norme de Merck Frosst) pour l'administration orale renferme 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg ou 80 mg de simvastatine ainsi que les ingrédients non médicinaux suivants :

acide ascorbique	hydroxypropylcellulose
acide citrique	lactose
amidon préagglutiné	méthylcellulose
butylhydroxyanisole	stéarate de magnésium
cellulose microcristalline	talc
dioxyde de titane	

Les comprimés ZOCOR® à 5 mg, à 10 mg et à 20 mg contiennent de l'oxyde ferrique jaune. Les comprimés ZOCOR® à 10 mg, à 20 mg, à 40 mg et à 80 mg contiennent en plus de l'oxyde ferrique rouge.

STABILITÉ ET ENTREPOSAGE

ZOCOR® doit être conservé à la température ambiante (entre 15 °C et 30 °C).

PRÉSENTATION

Le comprimé ZOCOR® à 5 mg est de couleur chamois, en forme de bouclier, enrobé par film, estampillé 726 d'un côté et Z de l'autre. Plaquette de 30.

Le comprimé ZOCOR® à 10 mg est de couleur pêche, en forme de bouclier, enrobé par film, estampillé 735 d'un côté et Z de l'autre. Plaquette de 30 et flacon en polyéthylène de haute densité de 500.

Le comprimé ZOCOR® à 20 mg est de couleur ocre, en forme de bouclier, enrobé par film, estampillé 740 d'un côté et Z de l'autre. Plaquette de 30 et flacon en polyéthylène de haute densité de 100.

Le comprimé ZOCOR® à 40 mg est de couleur rouge brique, en forme de bouclier, enrobé par film, estampillé 749 d'un côté et Z de l'autre. Plaquette de 30.

Le comprimé ZOCOR® à 80 mg est de couleur rouge brique, en forme de capsule, enrobé par film, estampillé 543 d'un côté et 80 de l'autre. Plaquette de 30.

MONOGRAPHIE FOURNIE SUR DEMANDE

(603-b,10,00)

Références

1. Crouse, J.R. et coll., « Effects of high doses of simvastatin and atorvastatin on high-density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein A-1 », *Am J Cardiol*, 83(10), 1999, p. 1476-1477.
2. Données consignées aux dossiers de Merck Frosst Canada & Cie, Merck Research Laboratories, 1999.
3. Données consignées aux dossiers de Merck Frosst Canada & Cie, monographie du produit, 1999.

34250186, 34250187, 34250188

Membre



MERCK FROSST

Découvrir toujours plus.
Vivre toujours mieux.

MERCK FROSST CANADA & CIE
C.P. 1005, POINTE-CLAIRE
DORVAL (QUÉBEC) H9R 4P8

problèmes cardiovasculaires... »

La société Bayer, pour sa part, tient à préciser : « Trois cent soixante-dix-neuf effets indésirables ont été rapportés par plus de 1,2 million de patients traités par la moxifloxacine. Il y a eu 22 cas de maladie cardiovasculaire, dont 15 étaient définis comme graves, y compris un seul cas de torsade de pointes chez une personne de 83 ans atteinte d'hypokaliémie grave, présentant des facteurs de risque et recevant des médicaments concomitants. Il s'avère, après une étude approfondie, que la majorité des incidents cardiovasculaires n'étaient pas liés à la moxifloxacine. »

2001, le début d'une vie sans tabac ?

Janvier, le mois des bonnes résolutions. Les fumeurs qui veulent rompre avec la cigarette peuvent profiter de la « Semaine québécoise pour un avenir sans tabac », qui se déroule du 14 au 20 janvier, pour y parvenir.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, à l'origine de cette initiative, lance également un dépliant intitulé *Je prends les moyens. J'ARRÊTE*. Celui-ci propose une démarche simple pour cesser de fumer et offre divers conseils. Des exemplaires sont disponibles dans les pharmacies Pharmaprix et dans de nombreux milieux de travail. On peut également l'obtenir à l'adresse suivante : www.cqts.qc.ca/sqast.

La dépendance à l'égard du tabac affecte encore près de deux millions de Québécois. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, un des partenaires de cette campagne, s'est donné comme objectif de faire passer le taux de fumeurs de 34 % à

28 % d'ici à 2002. D'autres provinces y sont déjà parvenues.

MTS et sida

protéger les jeunes hommes

Les hommes peuvent changer le cours de l'épidémie. Thème de la dernière journée mondiale sur le sida, ce message est aussi la trame de fond d'une brochure qui offre aux intervenants des stratégies pour aider les jeunes hommes à se protéger contre les MTS et l'infection par le VIH.

« Il apparaît nécessaire, pour mieux intervenir auprès des garçons, de prendre connaissance de leurs réalités particulières et de se familiariser avec certains éléments qui les rendent plus vulnérables face à la transmission des MTS et du VIH », explique la sexologue **Marie-Andrée Bossé**, dans le document intitulé *Les Garçons et la prévention des MTS et du VIH : vers des stratégies plus adaptées...*, publié par le ministère de l'Éducation.

Le danger des stéréotypes de la masculinité

Pour se définir en tant qu'hommes, certains garçons cherchent à se modeler sur les stéréotypes de la masculinité, ce qui les pousse peu à adopter un comportement sexuel prudent. Certains trouvent viril, par exemple, d'avoir plusieurs partenaires sexuelles, de faire fi des risques et de fuir les services médicaux.

Les condoms ? Beaucoup ne tiennent pas à en porter. Il brise le rythme de l'amour physique, coupe de certaines sensations et minore le plaisir, lui reprochent-ils. Alors

Lors d'essais cliniques contrôlés, le taux d'abandon en raison d'effets indésirables a été de 3,6 % chez les patients recevant Diovan-HCT et de 4,3 % chez ceux prenant le placebo.

Dans le cadre d'essais cliniques contrôlés, on a signalé à de rares occasions les réactions indésirables suivantes, susceptibles d'avoir de graves conséquences : syncope et hypotension.

Le tableau ci-après se fonde sur les résultats d'essais contrôlés à double insu menés chez des patients traités à l'aide de Diovan-HCT à raison de doses de 80 mg/12,5 mg, de 80 mg/25 mg, de 160 mg/12,5 mg et de 160 mg/25 mg. Ce tableau fait état de tous les effets indésirables survenus à une fréquence de 1 % ou plus dans le groupe Diovan-HCT, indépendamment du lien avec le médicament à l'étude.

	Diovan-HCT (n = 730) %	Diovan seul (n = 547) %	Hydrochlorothiazide seul (n = 200) %	Placebo (n = 93) %
Organisme entier				
Fatigue	4,7	2,7	5,5	1,1
Douleurs thoraciques	2,5	2,0	1,0	1,1
Système nerveux central				
Céphalées	10,8	9,9	14,0	17,2
Étourdissements	8,8	2,6	7,5	6,5
Insomnie	1,0	0,7	1,0	2,2
Appareil respiratoire				
Sinusite	3,2	2,2	3,0	3,2
Pharyngite	3,0	1,8	1,5	1,1
Infection des voies resp. sup.	3,0	5,1	3,5	2,2
Toux	2,9	2,9	2,5	0,0
Rhinite	1,9	2,4	3,5	0,0
Dyspnée	1,1	0,6	1,0	1,1
Bronchite	1,1	0,7	0,5	2,2
Appareil digestif				
Diarrhée	2,5	3,7	2,0	0,0
Nausée	1,9	0,9	2,0	1,1
Dyspepsie	1,6	1,7	1,5	1,1
Douleurs abdominales	1,4	1,5	2,0	0,0
Appareil locomoteur				
Douleurs lombaires	2,7	2,7	2,5	3,2
Douleurs au bras	1,2	0,4	1,5	0,0
Douleurs aux jambes	1,1	0,0	1,0	0,0
Entorses et foulures	1,1	1,3	0,0	0,0
Arthrite	1,0	0,6	0,0	0,0
Crampes dans les jambes	1,0	0,2	1,5	3,2
Peau				
Éruptions cutanées	1,0	0,7	3,0	1,1
Appareil génito-urinaire				
Infection urinaire	1,6	1,4	2,5	1,1
Polyurie	1,2	0,5	3,0	1,1
Impuissance	0,8	0,6	0,0	1,1
Sens particuliers				
Troubles de la vision	1,1	0,9	1,0	0,0
Autres				
Infections virales	2,5	4,0	4,0	1,1

Lors d'essais contrôlés à double insu portant sur Diovan employé seul, les effets indésirables suivants ont été signalés à une fréquence de moins de 1 % indépendamment du lien avec le médicament : troubles orthostatiques, douleur thoracique, palpitations, myalgie, asthénie, somnolence, vertiges, impuissance, épistaxis, alvéolite fibrosante (un cas), réactions allergiques, urticaire, prurit et éruptions cutanées.

Les données de post-marketing portant sur l'emploi de Diovan employé seul ont fait état, à de rares occasions, des autres réactions indésirables suivantes : anaphylaxie (très rare), œdème de Quincke (avec enflure du visage, des lèvres ou de la langue), photosensibilité, élévation de la tension artérielle et altération du goût.

Épreuves de laboratoire

Lors des essais cliniques, l'administration de Diovan-HCT a été peu fréquemment associée à des variations importantes sur le plan clinique, des paramètres de laboratoire standard.

Épreuves de la fonction hépatique : On a signalé des hausses occasionnelles des enzymes hépatiques chez les patients traités par Diovan-HCT.

Créatinine : On a observé de faibles élévations de la créatinine chez 1,4 % des patients traités par Diovan-HCT et chez 1,1 % des patients recevant le placebo lors des essais cliniques contrôlés.

Hémoglobine et hématocrite : Des diminutions de plus de 20 % du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite ont été notées chez 0,1 et 1,0 % respectivement des patients traités par Diovan-HCT, comparativement à 0,0 et 0,0 % des patients ayant reçu le placebo. Un patient traité par le valsartan a dû interrompre le traitement en raison d'une anémie microcytaire.

Neutropénie : Une neutropénie a été observée chez 0,6 % des patients recevant Diovan-HCT et chez 0,0 % des patients prenant le placebo.

SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE

On ne possède aucune donnée précise sur le traitement des surdoses de Diovan-HCT (valsartan-hydrochlorothiazide). En l'occurrence, il doit s'agir d'un traitement symptomatique et d'appoint.

Valsartan

On ne possède que peu de données sur Diovan (valsartan) concernant le surdosage chez l'être humain. Les manifestations de surdosage les plus probables seraient l'hypotension ou la tachycardie. Un traitement d'appoint devrait être instauré en cas d'hypotension symptomatique. La dialyse n'élimine pas le valsartan du plasma.

Hydrochlorothiazide

Les signes et symptômes observés le plus souvent sont ceux que provoque une déplétion électrolytique (hypokaliémie, hyponatrémie et hyponatémie) ainsi qu'une déshydratation consécutive à une diurèse excessive. Si le patient prend également de la digitale, l'hypokaliémie peut accentuer les arythmies cardiaques.

On n'a pas établi dans quelle mesure l'hémodialyse éliminerait l'hydrochlorothiazide.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

La posologie doit être adaptée à chaque patient. L'association fixe ne convient pas à un traitement initial. On établira la dose de Diovan-HCT (valsartan-hydrochlorothiazide) par adaptation posologique de chacune des composantes du médicament.

Une fois l'état du patient stabilisé au moyen des composantes individuelles tel qu'il est précisé ci-dessous, on peut leur substituer un comprimé de Diovan-HCT à 80 mg/12,5 mg ou à 160 mg/12,5 mg pris une fois par jour si les doses ayant permis de stabiliser l'état du patient sont les mêmes que celles de l'association fixe (voir INDICATIONS ET EMPLOI CLINIQUE).

Diovan-HCT peut être administré avec ou sans nourriture, mais toujours de la même façon.

Le valsartan en monothérapie

La dose initiale recommandée de Diovan est de 80 mg une fois par jour. L'effet antihypertensif se manifeste au cours des deux semaines suivant l'instauration du traitement, l'effet maximal étant habituellement atteint en quatre semaines. Chez les patients dont la tension artérielle n'est pas maîtrisée adéquatement, on peut augmenter la dose quotidienne à 160 mg ou y adjoindre un diurétique thiazidique.

Patients traités à l'aide d'un diurétique

Les patients qui prennent des diurétiques peuvent présenter un déficit volumique et être, en conséquence, plus sujets à l'hypotension par suite de l'instauration d'un traitement antihypertensif additionnel. Dans la mesure du possible, la prise de diurétiques devrait cesser de deux à trois jours avant l'administration de Diovan de façon à réduire le risque d'hypotension (voir MISES EN GARDE — Hypotension, ainsi que PRECAUTIONS — Interactions médicamenteuses). Si l'état du patient ne permet pas d'interrompre la prise de diurétiques, lui administrer Diovan avec prudence et surveiller de près sa tension artérielle. Il convient par la suite d'adapter la posologie en fonction de la réponse du patient.

Insuffisance hépatique

Aucune adaptation posologique initiale ne s'impose chez les patients souffrant d'une hépatopathie légère ou modérée. Toutefois, étant donné que les diurétiques thiazidiques peuvent déclencher un coma hépatique, la prudence est de rigueur lorsqu'on administre une association médicamenteuse fixe renfermant de l'hydrochlorothiazide (voir Précautions — Insuffisance hépatique).

Insuffisance rénale

Aucune adaptation posologique initiale ne s'impose chez les patients atteints d'insuffisance rénale, y compris chez ceux qui subissent une hémodialyse. Une surveillance adéquate de ces patients est toutefois recommandée.

On peut s'en tenir aux schémas thérapeutiques habituels de Diovan-HCT tant que la clairance de la créatinine du patient est > 30 mL/min. Chez les patients présentant une atteinte rénale plus grave, on préférera les diurétiques de l'anse aux diurétiques thiazidiques ; par conséquent, l'emploi de Diovan-HCT n'est pas recommandé chez ces patients.

Personnes âgées

Aucune adaptation posologique n'est habituellement nécessaire, mais le lecteur est prié de consulter la rubrique PRECAUTIONS — Personnes âgées.

PRÉSENTATION

Les comprimés "Diovan-HCT" (valsartan-hydrochlorothiazide) à 80 mg/12,5 mg sont offerts en boîtes contenant 2 plaquettes alvéolées de 15 comprimés chacune.

Les comprimés "Diovan-HCT" (valsartan-hydrochlorothiazide) à 160 mg/12,5 mg sont offerts en boîtes contenant 2 plaquettes alvéolées de 15 comprimés chacune.

Composition

Comprimé Diovan-HCT (valsartan-hydrochlorothiazide) à 80 mg/12,5 mg

Chaque comprimé enrobé par film ovaloïde orange clair portant la mention HGH d'un côté et CG de l'autre contient les ingrédients médicinaux suivants : 80 mg de valsartan et 12,5 mg d'hydrochlorothiazide. Chaque comprimé contient aussi les ingrédients non médicinaux suivants : dioxyde de silicone colloïdal, croscopovidone, stéarate de magnésium et cellulose microcristalline. L'enrobage contient de l'hydroxypropylméthylcellulose, du polyéthylène glycol, de l'oxyde de fer rouge, du talc, du dioxyde de titane et de l'oxyde de fer jaune.

Comprimé Diovan-HCT (valsartan-hydrochlorothiazide) à 160 mg/12,5 mg

Chaque comprimé enrobé par film ovaloïde rouge foncé portant la mention HHH d'un côté et CG de l'autre contient les ingrédients médicinaux suivants : 160 mg de valsartan et 12,5 mg d'hydrochlorothiazide. Chaque comprimé contient aussi les ingrédients non médicinaux suivants : dioxyde de silicone colloïdal, croscopovidone, stéarate de magnésium et cellulose microcristalline. L'enrobage contient de l'hydroxypropylméthylcellulose, du polyéthylène glycol, de l'oxyde de fer rouge, du talc et du dioxyde de titane.

Stabilité et conservation

Garder à une température variant de 15 à 30 °C, à l'abri de l'humidité.

* Marque déposée.

Monographie offerte sur demande

DIO-00-04-6564F Imprimé au Canada

NOVARTIS

Novartis Pharma Canada Inc.
Dorval (Québec) H9S 1A9

CCRP®

RebD

index des annonceurs

Renseignements
thérapeutiques

BELL CANADA

..... couv. III

FONDS D'INVESTISSEMENT FMOQ

Fonds FMOQ 120

Nomination 107

REER 15

FOURNIER PHARMA INC.

Lipidil 24 94

GLAXO WELLCOME INC.

Flovent 80 100-101

MERCK FROSST CANADA & CIE

Cozaar 12 90-93

Vioxx 32 108-111

Zocor couv. IV 114-116

NOVARTIS PHARMA CANADA INC.

Diovan 20 117-119

ORGANON CANADA LTÉE

Marvelon 14,19,70

PARKE-DAVIS/PFIZER CANADA INC.

Fem Hrt 60-61 86-88

PFIZER CANADA INC.

Aricept 10-11 96

Viagra 17 104-105

Zithromax couv. II 106-107

SEARLE CANADA

Arthrotec 62 97

SERVIER CANADA INC.

Coversyl 6 112

SMITHKLINE BEECHAM PHARMA

Paxil 36 102-103

SMITH & NEPHEW INC.

Santyl 22-23 103

SOLVAY PHARMA INC.

Pantoloc 18 82

WYETH-AYERST CANADA INC.

Prem Plus 30-31 98-99

Triphasil 8 95

119

comment inciter les jeunes hommes à néanmoins s'en servir ? La situation est complexe, selon diverses données recueillies par des chercheurs. Il semblerait que tant les filles que les garçons estiment que c'est à la partenaire féminine de proposer l'utilisation du préservatif, mais que dans bien des cas, c'est le garçon qui prend l'initiative des relations sexuelles et les décisions dans ce domaine. Les intervenants pourraient alors suggérer au jeune homme de proposer lui-même le condom, mais il lui est souvent difficile d'aborder le sujet avec sa partenaire.

Les jeunes homosexuels, pour leur part, doivent faire face à d'autres obstacles. « Il semble difficile pour un adolescent qui s'interroge sur son orientation sexuelle de s'estimer et d'accepter sa sexualité dans un contexte où les



Pour des finances en pleine santé !

Rendements annuels composés (%) au 31 décembre 2000

Fonds FMOQ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans ou depuis création
Omnibus*	4,06	8,56	11,57	11,87
Placement**	- 0,13	12,18	15,62	15,16
Monétaire	5,43	4,89	4,51	5,69
Obligations	3,91	1,38	3,30	5,97 (27.09.91)
Actions canadiennes	9,89	13,04	15,54	14,11 (31.05.94)
Actions internationales	- 12,55	11,46	12,60	8,59 (31.05.94)
Équilibré*	0,11	s.o.	s.o.	11,23 (27.11.98)

* Exclusif aux régimes enregistrés • ** Exclusif aux régimes non enregistrés

Dre Yolaine Fournier (Rouyn-Noranda)
et **Dr Yvon Prévost** (Longueuil)

sont les gagnants du concours «Cybervisite».

Merci à tous les participants.

Montréal

1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 1012
Montréal (Québec)
H3G 1R8

Téléphone : **(514) 868-2081**
Sans frais : **1 888 542-8597**
Télécopieur : (514) 868-2088

Québec

Place Iberville III
2960, boulevard Laurier
Bureau 040
Ste-Foy (Québec) G1V 4S1

Téléphone : **(418) 657-5777**
Sans frais : **1 877 323-5777**
Télécopieur : (418) 657-7418

Site Web : www.fondsfoq.com • Courriel : info@fondsfoq.com

Lignes d'information automatisées : (514) 868-2087 ou 1 800 641-9929

Les Fonds FMOQ sont vendus au moyen d'un prospectus simplifié disponible auprès de Les Fonds d'investissement FMOQ inc., cabinet de services financiers. Un placement dans les Fonds FMOQ s'effectue sans frais, mais implique des frais de gestion annuels, prélevés à même les Fonds. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur et qui aurait pour effet de réduire le rendement net. Les Fonds FMOQ ne sont pas garantis, ni couverts par un organisme d'assurance-dépôts. La valeur des parts fluctue souvent et rien ne garantit que le plein montant de votre placement vous sera retourné. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Le rendement historique annualisé du Fonds monétaire FMOQ est de 5,31 % pour la période de sept jours arrêtée à la date du présent rapport, celui-ci ne représente pas un rendement réel sur un an.

autres garçons rejettent, ridiculisent, voire violentent les garçons étiquetés comme « homosexuels ». Difficile de protéger sa vie quand on a le sentiment d'avoir si peu de valeur... », avertit M^{me} Bossé.

Quelques stratégies

Comment faire passer les messages de prévention ? La sexologue conseille de créer une atmosphère dans laquelle les jeunes hommes puissent parler de leur sexualité sans craindre d'être jugés ou ridiculisés, qu'ils soient en petits groupes ou seuls avec l'intervenant. Le contexte idéal pour certaines discussions est celui d'activités libres, par exemple une partie de billard, plutôt que le cadre classique des consultations. L'auteure de la brochure propose plusieurs thèmes à aborder avec les jeunes hommes : les stéréotypes de la virilité, les différentes conceptions de la masculinité, les règles sociales régissant les relations entre les garçons et les filles, notamment dans le déroulement des relations sexuelles et l'utilisation du condom. « Il est important pour mieux rejoindre et mobiliser les garçons de tenir compte de la principale motivation de ces derniers face aux relations sexuelles : la possibilité d'avoir du plaisir », rappelle M^{me} Bossé.

Le document *Les Garçons et la prévention des MTS et du VIH : vers des stratégies plus adaptées...* sera disponible dans Internet à l'adresse suivante :

www.meq.gouv.qc.ca/dassc. On peut également obtenir des brochures en s'adressant à M^{me} Denise Thériault, au ministère de l'Éducation, au (418) 646-4596.